

報道発表資料

2024年3月23日  
東京慈恵会医科大学  
山梨大学

## 光活性化アデニル酸シクラーゼをプレシナップスに局在化させる技術を開発 ～細胞内シグナル伝達系と神経活動の光操作による可塑性誘導に応用～

東京慈恵会医科大学総合医科学研究センター臨床医学研究所の永瀬将志助教と渡部文子教授らは、山梨大学大学院総合研究部生化学講座第一教室の大塚稔久教授らと共同でプレシナップス局在型の光活性化アデニル酸シクラーゼ (bPAC) を開発しました。さらに、このプレシナップス局在型 bPAC と長波長シフト変異型光活性化陽イオンチャネルを組み合わせることによって、細胞内シグナル伝達系と神経活動を全て光で操作する技術開発に成功しました。シナップス伝達の可塑性は、脳が持つ柔軟でダイナミックな機能の基盤であることから、今回開発した技術は、シナップス制御と脳機能との関係解明、神経精神疾患の病態理解や治療法確立などに役立つことが期待されます。

本研究成果は、日本時間 2024 年 3 月 23 日に *Cell Reports Methods* 誌に掲載されます。

### 【研究成果】

- bPAC をプレシナップス分子と融合させると発現がプレシナップス終末に集中することを見出しました。
- 赤色光でシナップス活動を、青色光で cAMP 上昇をそれぞれ誘導する実験系を構築し、素早く顕著なシナップス増強を誘導する技術を開発しました。
- このシナップス増強はプレシナップス性のメカニズムによって誘導されることを明らかにしました。
- プレシナップス局在型 bPAC は *in vivo* での光操作に有用であることを実証しました。

本研究は、AMED 脳と心の研究推進プログラム(革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明プロジェクト(Brain/MINDS))などの支援を受けたものです。

### 論文情報

雑誌名: *Cell Reports Methods*

論文タイトル: All-optical presynaptic plasticity induction by photoactivated adenylyl cyclase targeted to axon terminals

著者: 永瀬将志<sup>1</sup>, 永嶋宇<sup>1</sup>, 浜田駿<sup>2</sup>, 森島美絵子<sup>1</sup>, 遠山卓<sup>1</sup>, 有馬史子<sup>1</sup>, 日吉加菜映<sup>1</sup>, 平野知葉<sup>2</sup>, 大塚稔久<sup>2\*</sup>, 渡部文子<sup>1\*</sup> (\*責任著者)

1. 東京慈恵会医科大学 総合医科学研究センター 臨床医学研究所

2. 山梨大学 大学院総合研究部 生化学講座第一教室

DOI: 10.1016/j.crmeth.2024.100740

### 【本研究内容についてのお問い合わせ先】

東京慈恵会医科大学 総合医科学研究センター 臨床医学研究所 教授 渡部文子 (わたべ あやこ)  
電話 03-3433-1111(代) メール awatabe@jikei.ac.jp

山梨大学 大学院総合研究部 生化学講座第一教室 教授 大塚稔久 (おおつか としひさ)  
電話 055-273-6740 メール tohtsuka@yamanashi.ac.jp

### 【報道機関からのお問い合わせ窓口】

学校法人慈恵大学 経営企画部 広報課  
電話 03-5400-1280 メール koho@jikei.ac.jp

国立大学法人山梨大学 総務企画部 総務課 広報企画室  
電話 055-220-8005 メール koho@yamanashi.ac.jp

## 研究の詳細

### 1. 背景

細胞内シグナル伝達系はさまざまな細胞で重要な役割を担います。中枢神経系では、多様な脳機能のために細胞内シグナル伝達系が時間的・空間的に緻密に制御されています。特にシナプス可塑性は、脳の柔軟な機能を支える基礎過程であり、例えばプレシナップスの環状アデノシン一リン酸 (cAMP) は、神経伝達物質の放出を促進することでシナプス可塑性を制御します。高い極性をもつ神経細胞では細胞内シグナル伝達系を特定のマイクロドメインで制御することが重要です。そこで本研究では、細胞内シグナル伝達系の光遺伝学ツールである光活性化アデニル酸シクラーゼ (bPAC) に着目し、bPACをプレシナップスに局在化させる手法の開発に取り組みました。

### 2. 手法と成果

bPACをプレシナップスに局在化させるために、プレシナップス分子である synapsin1aを融合させた bPAC-Syn1aを作製したところ、プレシナップス終末に高い選択性で局在化することを発見しました。さらに、赤色光で活性化される、長波長シフト変異型光活性化陽イオンチャネルの C1ChrimsonSA (Synaptic activity) と、bPAC-Syn1a (青色光で活性化) を組み合わせることで、赤色光でシナップス活動を、青色光でcAMP上昇をそれぞれ誘導する実験系を構築し、素早く顕著なシナップス増強を全光学的に誘導する技術開発に成功しました。このシナップス増強は神経伝達物質の放出確率の増加を伴ったことから、プレシナップス性のメカニズムによって誘導されることを明らかにしました。また、bPAC-Syn1aを脳内に発現させたマウスに光刺激を与えることで行動変容が生じたことから、bPAC-Syn1aが *in vivo* での細胞内シグナル伝達系の光操作に有用であることを実証しました (図1)。




図1. 本研究の概要 (原著論文より)

### 3. 今後の応用、展開

プレシナップスの cAMP シグナル伝達系は、記憶・学習の基礎過程であるシナップス可塑性や、軸索伸長など、さまざまな機能を制御しています。本研究で開発したプレシナップス局在型 bPAC-Syn1a は *in vitro* や *in vivo* において、これらの cAMP 依存的な機能の制御に有用なツールであると期待されます。また、全光学的なシナップス増強誘導技術を活用することによって、シナップス可塑性と脳機能との因果関係に迫る研究に繋がることが期待されます。

### 4. 用語説明

- 光遺伝学：光活性化タンパク質を遺伝学的手法によって神経細胞などに発現させ、活動や機能を光で制御する技術です。代表的な光活性化タンパク質として、微生物から単離された光活性化陽イオンチャネルであるチャネルロドプシンが広く用いられています。赤色光で活性化される光活性化陽イオンチャネルとして Chrimson が単離されており、本研究ではその長波長シフト変異型の C1ChrimsonSA を用いました。
- 光活性化アデニル酸シクラーゼ (photoactivated adenylyl cyclase, PAC)：ミドリムシなどから単離された光活性化タンパク質で、青色光によって cAMP を増加させます。本研究では *Beggiatoa* 由来の PAC (bPAC) を用いました。